



## Origen del cultivar

Variedad de polinización abierta obtenida de selecciones a partir de una población local de la zona de Pantanoso del Sauce, Canelones. Liberada en el año 2009.

## Ciclo de producción

Cultivar de día corto a medio, de cosecha semi temprana, con vuelco del 50% de las plantas en la primera quincena de diciembre en el sur y en la primera quincena de noviembre en el norte.

## Características del bulbo

Los bulbos son de forma globosa o redonda. Las catáfilas externas son de color rojo y retención buena en poscosecha. Presenta pungencia media. La conservación poscosecha es intermedia (3 meses).

## Características de la planta

La planta muestra un desarrollo vegetativo muy vigoroso, hojas de color verde oscuro y cutícula cerosa. La resistencia a floración prematura es muy alta.

## Sanidad

La resistencia a enfermedades foliares como botrytis (*Botrytis squamosa*) y peronospora (*Peronospora destructor*) es intermedia, en esta última con mayor incidencia que severidad. Presenta mayor susceptibilidad a daños de trips en bulbos en conservación.

## Recomendaciones de uso

'INIA Naqué' es recomendable para la producción de cebollas coloradas de bulbo y verdeo, con un destacable comportamiento sanitario que lo hace adecuado para la producción orgánica e integrada. La fecha de siembra de almárgicos más adecuada es la primera quincena de abril tanto en la zona sur como en el norte. Debe manejarse adecuadamente para evitar un excesivo vigor y favorecer un buen cerrado de cuello. Para cebolla de verdeo se pueden realizar fechas más tempranas a las mencionadas o implantar cultivos directamente de bulbos. La productividad potencial es muy alta, superior a la de 'INIA Casera' y similar a la de 'Pantanoso del Sauce CRS'.

## Status varietal

Cultivar protegido. Bajo licencia de multiplicación y comercialización.



INIA Naqué