



Origen del cultivar

Producto del cruzamiento realizado en 1997 entre una selección del proyecto y una variedad comercial. Seleccionada como clon '793101.3'. Liberada en el año 2013.

Ciclo de producción

Cultivar de ciclo semitemprano-semitardío (100 días) y dormición de tubérculo corta (60 días).

Características del tubérculo

Tubérculos de tamaño medio y forma oval, con piel y pulpa color crema pálida. Tiene buena apariencia comercial y aptitud para el lavado (tolerancia al verdeado) sin presentar daños significativos por defectos fisiológicos. Se destaca por su calidad culinaria para diferentes usos (multipropósito), con muy buena calidad de frito.

Características de la planta

Emerge rápido y en forma uniforme luego de la plantación. Presenta hábito semierecto y buen vigor de follaje cubriendo bien el suelo desde etapas tempranas del cultivo. Foliolos de tamaño mediano, color verde oscuro. Tallo grueso y alado. Floración poco abundante de color lila.

Sanidad

Inmune al virus del mosaico rugoso (PVY), tolerante al virus del enrollamiento (PLVR) y a tizones, y resistente a sarna común (*Streptomyces scabies*).



Recomendaciones de uso

'INIA Guaviyú' presenta buena adaptación general a condiciones de cultivo a nivel nacional. Se adapta al doble ciclo continuado de cultivo (otoño-primavera-otoño). Permite una fácil multiplicación, aún en zonas no especializadas para la producción de semilla. Puede ocupar un espacio dentro de sistemas productivos hortícolas poco o medianamente especializado en la producción de papa. Puede ser considerada en procesos industriales locales (prepelado, chips) o diferenciada por sistema de producción y calidad culinaria.

Status varietal

Cultivar protegido. Bajo acuerdos de producción.



INIA Guaviyú