

Roble Palustris

Quercus palustris Muenchh.



Es un roble dentro de las numerosas especies del género *Quercus*, Sección Lobatae, perteneciente a la familia de las fagáceas.

Roble turco

Quercus castaneifolia C.A. Mey.



Roble persa o roble hoja de castaño, es una especie fanerógama de roble en la sección turca de robles *Quercus* sect. *Cerris*.

Ligustro

Ligustrum vulgare L.



La alheña o ligustro es el nombre común de las especies botánicas pertenecientes al género *Ligustrum*, el cual abarca cerca de 40-50 especies aceptadas

Casuarina

Casuarina equisetifolia L. ex Adans



Casuarina equisetifolia es una especie de árboles semiperennes, de costas tropicales, muy útil como cortina forestal rompeviento. Es endémico de Australia, Malasia, Polinesia.

Ibirapitá

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.



Es un árbol de la familia Leguminosae, subfamilia Caesalpinioideae. En la Argentina y el Paraguay es denominado comúnmente yvyrá-pytá, ibirá puitá guazú, o ibirapitá

Paraíso

Melia azedarach L.



Llamado popularmente cinamomo, agriaz, lila, paraíso sombrilla o árbol del paraíso, es un árbol mediano, de hoja caduca, de la familia de las meliáceas.

Ciprés calvo

Taxodium distichum (L.) Rich.



Ciprés de los pantanos o ciprés calvo, es un árbol de la familia de las Taxodiáceas originaria del sudeste de los Estados Unidos. Es una especie que se adapta muy bien a los medios húmedos.

Lapacho

Tabebuia GOMES EX DC.



Es un género que comprende alrededor de un centenar de especies de árboles nativos de la zona intertropical de América, extendidas desde México, Perú y el Caribe

Catalpa

Catalpa bignonioides Walt.



Catalpa es un género de árboles caducos de la familia de las bignoniáceas, nativo de regiones templadas de Norteamérica, las Indias Occidentales y el Asia oriental.

Anacahuita

Schinus molle L.



El aguaribay, gualeguay, o anacahuita, es una especie arbórea de hojas perennes perteneciente a la familia Anacardiaceae, originaria del sur de Brasil, Uruguay, y la mesopotamia argentina; puede llegar a medir alrededor de 15 metros de altura.

Castaño

Castanea sativa Mill., Gard.



El castaño, es un árbol que pertenece a la familia de las fagáceas, cuyo fruto, la castaña, es comestible y fué una importante fuente alimenticia, en particular en los países mediterráneos.

Nogal europeo

Juglans regia L.



El nogal común, nogal europeo o nogal español, y, en México, nuez de Castilla es un árbol monoico y caducifolio de la familia de las *Juglandaceae* en el orden de las Fagales.

Acacia persa

Albizia Julibrissin Durz



Árbol de la seda o Acacia de Constantinopla, aunque no es una verdadera Acacia, sino una especie de un género próximo perteneciente a la misma subfamilia *Mimosoideae*, dentro de la familia *Fabaceae*.

Ciprés

Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gord.



Ciprés de Monterrey, es una especie arbórea de la familia de las Cupresáceas, originaria del sudoeste de los EE. UU.

Eucalipto grandis

Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden



Comúnmente conocido como eucalipto rosado, es un árbol de corteza suave, áspero en la base fibrosa o escamosa, de color gris a gris-marrón.

Eucalipto globulus

Eucalyptus globulus LABILL.



El eucalipto blanco, eucalipto común o eucalipto azul. *Eucalyptus globulus* es una especie arbórea de la familia de las mirtáceas, originaria del sureste de Australia y Tasmania.

Eucalipto colorado

Eucalyptus tereticornis SM



El eucalipto rojo, es un importante árbol del género *Eucalyptus*. Es una especie plantada en muchas partes del mundo. Es nativa de Australia donde está ampliamente expandida.

Eucalipto blanco

Eucalyptus maidenii F.MUELL.



Comúnmente conocido como Eucalipto de Maiden, es una especie nativa del este de Victoria y el sureste de Nueva Gales del Sur, Australia. Crece en bosques húmedos en valles en suelos fértiles en valles de cordilleras subcosteras