



Boletín Agroclimático

Síntesis de la Situación Agroclimática de Febrero

En base a la estimación, monitoreo y análisis que realiza la Unidad GRAS del INIA de las variables agroclimáticas *precipitaciones, porcentaje de agua en el suelo, índice de bienestar hídrico, e índice de vegetación*, se puede apreciar que el estado hídrico promedio de los suelos durante el mes de febrero fue aceptable a bueno en parte importante del territorio nacional, estimándose valores de porcentaje de agua disponible (PAD) de 40% o superiores. Las precipitaciones acumuladas durante todo el mes variaron entre 75 y 400 mm. En cuanto al estado de la vegetación, los valores promedio de IVDN del mes de febrero fueron iguales o superiores a los esperables para este mes del año en gran parte del país.

Contenido:

Índice de Vegetación (IVDN)	2
Precipitaciones	2
Porcentaje de Agua Disponible (PAD)	3
Índice de bienestar hídrico (IBH)	3
Agua no retenida (ANR)	3
Perspectivas Climáticas	4

Perspectivas Climáticas Trimestrales Mar-Abr-May elaboradas por el IRI de la Universidad de Columbia

Para las precipitaciones acumuladas y la temperatura promedio del trimestre Marzo-Abril-Mayo de 2012, no se estiman sesgos en las probabilidades de cada tercil. Es así que existen iguales probabilidades de que las lluvias acumuladas y la temperatura promedio en dicho trimestre sean iguales, mayores o menores a lo normal.

Mayor información puede encontrarse en el sitio del IRI:

<http://www.iri.columbia.edu>

RECOMENDACIÓN

Recomendamos leer “Preguntas frecuentes” sobre las perspectivas climáticas, dentro del sitio web del GRAS en el vínculo:

http://www.inia.org.uy/online/files/contenidos/preguntas_frecuentes_pers_p_clim.pdf

Índice de Vegetación (IVDN)


El índice de vegetación diferencia normalizada, **IVDN o NDVI**, es una variable que permite estimar el desarrollo de la vegetación en base a la medición, con sensores remotos satelitales, de la intensidad de la radiación de ciertas bandas del espectro electromagnético que la misma emite o refleja. Este es el resultado de la interpretación de las imágenes producidas a partir de información captada por el satélite NOAA-AVHRR

Los valores de IVDN oscilan entre -1 y 1. El índice permite identificar la presencia de vegetación verde en la superficie y caracterizar su distribución espacial así como la evolución de su estado a lo largo del tiempo. Como referencia: El agua presenta valores negativos de IVDN. El suelo

descubierto y con vegetación rala, seca, o bajo estrés, presenta valores positivos aunque no muy elevados (0,2 a 0,45). La vegetación densa, húmeda, sana o bien desarrollada presenta los mayores valores de IVDN (mayores a 0,5).. **En la figura se observan los valores promedio de IVDN del mes de febrero. En la mayor parte del país se determinaron índices iguales o superiores a los esperables para este mes del año. Sólo en algunas áreas del centro y este los valores fueron bajos.**


Las lluvias ocurridas durante este mes permitieron una clara recuperación del estado de la vegetación en relación al mes de enero.

IVDN de febrero de 2012




Precipitaciones

Precipitaciones en febrero de 2012



Anomalías de febrero de 2012



Se define como anomalía mensual a la diferencia entre el valor de precipitación actual menos el valor de la mediana (percentil 50%) histórica. Los valores negativos, representados con colores rojos, significan registros por debajo de la normal o del valor histórico esperado para el período.

Como se observa en la figura de la izquierda, las precipitaciones acumuladas durante todo el mes de febrero variaron promedialmente entre 75 y 400 mm en el territorio nacional. En el mapa de “anomalías” (derecha) se pueden observar las áreas con valores registrados inferiores a los esperados para este mes (colores rojizos) y superiores a los esperados para este mes (colores amarillos y verdes).

Porcentaje de Agua Disponible (PAD)

El porcentaje de agua disponible en el suelo se define como: $(ADI/CC)*100$, donde ADI es la cantidad de agua en el suelo y CC es la capacidad de campo de ese suelo.

En términos muy generales se consideran umbrales críticos de porcentaje de agua en el suelo valores por debajo de 40-50% en cultivos extensivos y valores por debajo de 30 - 40% en pasturas sembradas.


En base a la estimación del porcentaje de agua disponible en el suelo que resulta del balance hídrico a nivel nacional (resolución de 30x30 km) elaborado por la Unidad GRAS del INIA, se puede

apreciar en la figura que el estado hídrico promedio de los suelos en el mes de febrero fue aceptable a bueno en parte importante del territorio nacional, estimándose valores de porcentaje de agua disponible de 40% o superiores.

En la tercera década del mes, el buen estado hídrico de los suelos se generalizó a la mayor parte del país. Se puede ver este mapa en:

http://www.inia.org.uy/disciplinas/agroclima/bh/datos/imagenes/pad2012_023.gif

PAD de febrero de 2012




Índice de Bienestar Hídrico (IBH)

El IBH resulta de la relación entre la transpiración real (estimada por el modelo de balance hídrico nacional) y la demanda potencial diaria (ETR/ETP). Valores cercanos a 100% indican que la vegetación se encuentra en valores de transpiración cercanos a la demanda potencial. Por el contrario valores de IBH cercanos a 0% indican que la vegetación se encuentra en valores de transpiración muy por debajo de la demanda potencial, indicando que climatológicamente la vegetación se encuentra bajo stress hídrico. Sin bien el índice de bienestar hídrico es un parámetro muy genérico y

poco específico, sirve para dar una idea complementaria del estado de la vegetación en base a las variables utilizadas en el cálculo del balance hídrico. En general se considera que valores de índice de bienestar hídrico por debajo de 50% indican condiciones de estrés en la vegetación. Como se observa en la figura, el índice de bienestar hídrico promedio estimado en el mes de febrero presentó valores relativamente buenos (50% o más) en parte importante del país, excepto en la zona sureste donde los valores fueron menores.

IBH de febrero de 2012




Agua No Retenida (ANR)

Otra salida del modelo de balance hídrico es el Agua no retenida la cual se define como la suma del Escorrentía superficial y Excesos de agua en el suelo (Agua que excede el contenido de agua del suelo a capacidad de campo)

Como se puede observar en el mapa de la salida del modelo de balance hídrico "Agua No Retenida" en el

suelo, se estimaron para el mes de febrero volúmenes significativos de agua excedente en el suelo en la zona norte del país.

ANR de febrero de 2012




Perspectivas Climáticas Mar-Abr-May 2012 elaboradas por el IRI de la Universidad de Columbia




Las últimas perspectivas climáticas trimestrales elaboradas por el IRI para **Marzo, Abril y Mayo** no estiman sesgos en las probabilidades de los terciles de las precipitaciones ni de la temperatura del aire, lo cual significa iguales probabilidades de que las lluvias acumuladas y la temperatura promedio en el trimestre sean iguales, mayores o menores que lo normal. Los resultados se expresan en los siguientes mapas.

Precipitación



Temperatura



INIA - Unidad GRAS

INIA - Unidad de Agroclima y Sistemas de Información
E.E. Wilson Ferreira Aldunate - INIA Las Brujas
Ruta 48 km. 10 - Rincón del Colorado
Canelones - Uruguay


Teléfono: 2367.76.41
Fax: 2367.76.41 int. 1758
Correo: gras@inia.org.uy

Página web:

www.inia.org.uy/gras



Destacamos el producto desarrollado e incluido en el Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Climáticos de la Unidad GRAS: **“Estimación de agua disponible en el suelo por sección policial”**



Se encuentra en el sitio de la Unidad www.inia.org.uy/gras en el ícono “Balance Hídrico” y el link directo es:

<http://www.inia.org.uy/online/site/752410I1.php>