


Recomendaciones para la alimentación de las colmenas en primavera

La alimentación de las colmenas con azúcares constituye un manejo estratégico para asegurar la supervivencia colonial o anticipar flujos de néctar. Sin embargo, esta práctica implica algunos riesgos, ya que en la medida que las abejas no consuman todo el alimento administrado, los restos de azúcares utilizados pueden mezclarse con el néctar acopiado por las abejas y ser finalmente cosechados con la miel. Esto puede afectar la comercialización de la miel.

Para evitar que esto suceda, el apicultor DEBE tener en cuenta tres factores interrelacionados entre sí y de igual importancia:

- 1** El **MOMENTO** de alimentación. Se debe realizar la alimentación en ausencia de alzas melarias* para la posterior cosecha de miel.

*Se consideran alzas melarias al material que se agrega para que la colonia almacene la miel a cosechar. Aquellas alzas con miel que se dejan en las colonias en otoño en ciertas partes del país para asegurar la supervivencia invernal de la colonia, no son consideradas alzas melarias.
- 2** Los **VOLÚMENES** de jarabe administrados deben ser los adecuados para asegurar que sean totalmente consumidos en el corto plazo por la colonia.
- 3** Los **ESPACIOS** internos de las colmenas deben ser mínimos cuando se administra la alimentación.



Si sospecha que, a pesar de tomar las precauciones correspondientes, su cosecha puede tener restos del alimento suministrado, debe cosechar y extraer la miel en envases diferenciados y aportar esta información en el momento de la comercialización.

Como una rutina de Buenas Prácticas de Manejo, se recomienda llevar registros de cada operación de alimentación: alimento suministrado, proveedor, volumen y fechas de cada administración y de agregado de alzas melarias.

La alimentación complementaria forma parte de las buenas prácticas apícolas y no debería ser considerada como un manejo eventual o improvisado. Es responsabilidad de toda la cadena, asegurar la calidad de nuestras mieles y mantener su reconocimiento mundial de miel natural, pura y genuina.



¿Alimentación en verano?

En nuestro país, la alimentación en primavera tiene como fin acelerar el desarrollo de la colonia, mientras que, en verano, la alimentación de incentivo tiene escasos beneficios.

Debido a esto y a la posibilidad de adulterar involuntariamente la miel, la alimentación en verano debería ser administrarse únicamente frente a condiciones climáticas adversas como por ejemplo una seca.

En este momento, las recomendaciones sugeridas para la alimentación en primavera deben ser extremadas.

Material de apoyo a los apicultores generado en el ámbito del Grupo de Trabajo de Buenas Prácticas Apícolas para la alimentación de las colmenas, con la participación de Felipe Arburua, Gerald Atrio, Belén Branchiccela, Juan Campá, Néstor Causa, Federico Coll, Mauricio Grajales, Jorge Harriet, Rosana Díaz, Alejandro Fachola, Gustavo Fripp, Felipe Marín, Estela Santos y Néstor Viera.