

Síntesis de la situación agroclimática de agosto

En base a la estimación, monitoreo y análisis que realiza el GRAS del INIA de las variables agroclimáticas: *precipitaciones, porcentaje de agua en el suelo, índice de bienestar hídrico e índice de vegetación*, se puede apreciar que el estado hídrico “promedio” de los suelos durante el mes de agosto mostró condiciones de perfil con valores estimados de contenido de agua en el suelo (porcentaje de agua disponible, PAD) mayores al 80% en gran parte del país. Los valores estimados de PAD fueron similares a los esperados para este mes del año todo el país. Las precipitaciones acumuladas variaron promedialmente entre 30mm y 140mm aproximadamente, registrándose valores superiores a los esperables para agosto en gran parte del país salvo en la zona sur y sureste, y un área puntal en el norte, donde estos valores fueron inferiores. En cuanto al estado de la vegetación, se observaron valores de NDVI superiores o similares a los esperados para este mes del año prácticamente todo el país .


Perspectivas climáticas trimestrales elaboradas por el IRI de la Universidad de Columbia

De acuerdo a las perspectivas climáticas elaboradas por el IRI para las precipitaciones acumuladas en el trimestre Setiembre-October-Noviembre en conjunto, se estiman mayores probabilidades (40-50%) de que las precipitaciones estén por encima de lo normal en todo el país.

Para la temperatura media del aire, analizando ese mismo trimestre, se estiman mayores probabilidades (40%-60%) de que las temperaturas estén por encima de lo normal en todo el territorio.

Más información puede encontrarse en el sitio del IRI: <http://www.iri.columbia.edu>

Índice de vegetación (NDVI)



Los valores registrados del índice de vegetación para el mes de agosto fueron superiores o similares a los esperables para este mes del año en prácticamente todo el país.


El índice de vegetación diferencia normalizada, **NDVI o IVDN**, es una variable que permite estimar el desarrollo de la vegetación en base a la medición, con sensores remotos satelitales, de la intensidad de la radiación de ciertas bandas del espectro electromagnético que la misma emite o refleja.

Los valores de NDVI oscilan entre -100 y 100. El índice permite identificar la presencia de vegetación verde en la superficie y caracterizar su distribución espacial así como la evolución de su estado a lo largo del tiempo.



Como referencia:

- Agua: valores negativos de NDVI.
- Suelo descubierto y con vegetación rala, seca, o bajo estrés: valores positivos no muy elevados.
- Vegetación densa, húmeda, sana o bien desarrollada: presenta los mayores valores.



Estas diferencias se pueden apreciar en la imagen de la derecha donde figuran los desvíos de los valores de este mes respecto al promedio de los meses de agosto de la serie histórica 2000-2021. Los colores indican rangos de % de desvío en relación a la media de esa serie histórica (la que se considera en el rango -10 y 10, color gris), representándose en tonos de verde los valores mayores al promedio y los menores en amarillo, naranja y rojo.



Precipitaciones



Como se observa en la figura, las precipitaciones acumuladas durante todo el mes de agosto variaron “promedialmente” entre 30mm y 140mm aproximadamente.




En el mapa de “anomalías” se puede observar que los valores de precipitación registrados fueron superiores a los esperados para este mes del año (tonos de crema y verde) en gran parte del país. Se observan en la zona sur y sureste y un área específica al norte, valores inferiores (color rosado).

Comparación en base a la mediana calculada para este mes, considerando el período 1961-2009.


Se define como anomalía mensual a la diferencia entre el valor de precipitación actual menos el valor de la mediana (percentil 50%) histórica. Los valores negativos, representados con colores rojos, significan registros por debajo de la normal o del valor histórico esperado para el período. Tonos de verde representan registros superiores a la normal

Porcentaje de agua disponible (PAD)




El estado hídrico promedio de los suelos en el mes de agosto (figura superior) fue de contenido de agua en el perfil con valores estimados de PAD superiores al 60% en todo el país.

En el mapa de “anomalías” se puede observar que los valores de PAD estimados fueron similares (color crema) a los esperados para este mes del año en todo el país.



Se define como anomalía mensual a la comparación entre el valor de porcentaje de agua disponible en el suelo (PAD) para un mes dado contra la media para dicho mes, considerando una serie histórica de 20 años (2000-2019). Los valores negativos, representados con colores amarillo, naranja y rojos, significan registros por debajo del promedio histórico estimado para ese mes. Tonos de verde representan registros superiores.

Agua no retenida (ANR)




Otra salida del modelo de balance hídrico es el Agua no retenida en el suelo, la cual se define como la suma del Escorrentamiento superficial y Excesos de agua en el suelo (Agua que excede el contenido de agua del suelo a capacidad de campo).

Como se puede observar en el mapa, para el mes de agosto, se estimaron volúmenes de agua excedente en gran parte del país (tonos de verde azulado), con máximos de hasta 100mm.

Índice de bienestar hídrico (IBH)

El IBH resulta de la relación entre la transpiración real (estimada por el modelo de balance hídrico nacional) y la demanda potencial diaria (ETR/ETP). Valores cercanos a 100% indican que la vegetación se encuentra en valores de transpiración cercanos a la demanda potencial. Por el contrario valores de IBH cercanos a 0% indican que la vegetación se encuentra en valores de transpiración muy por debajo de la demanda potencial, indicando que climatológicamente la vegetación se encuentra bajo stress hídrico. En general se considera que valores de índice de bienestar hídrico por debajo de 50% indican condiciones de estrés en la vegetación.




Como se observa en la figura, el índice de bienestar hídrico promedio estimado en agosto presentó valores de entre 70% y 100%.

Perspectivas climáticas set-oct-nov elaboradas por el IRI de la Universidad de Columbia




Para el trimestre Setiembre-Octubre-Noviembre y en relación a las precipitaciones acumuladas en ese trimestre en conjunto, se estiman mayores probabilidades (40%-50%) de que las precipitaciones estén por encima de lo normal en todo el país.

Para la temperatura media del aire, en el mismo trimestre, se estiman mayores probabilidades (40%-60%) de que las temperaturas en esos meses en conjunto, estén por encima de lo normal.

IRI Multi-Model Probability Forecast for Precipitation for September-October-November 2023, Issued August 2023



IRI Multi-Model Probability Forecast for Temperature for September-October-November 2023, Issued August 2023



Destacamos para este mes

Previsión de condiciones ambientales para corderos recién nacidos.

Mapas a nivel nacional mostrando una estimación a 3 días del índice biométrico Chill Index o Índice de enfriamiento y sus niveles de riesgo.

[link directo](#)

Consultas y comentarios a: gras@inia.org.uy

